PRECAUCIONES GENERALES:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.
*Use ropa protectora adecuada durante la manipulación, ropa con mangas largas, delantal impermeable, botas y guantes impermeables, antiparras y mascaras con filtro Adecuado.
*Evite el contacto con piel, ojos, nariz y boca.
*Evite comer, fumar o beber durante el manipuleo y aplicación del producto.
*Después de la aplicación, lave cuidadosamente las ropas y partes del cuerpo expuestas al producto.
*Mantenga este y todos los productos fitosanitarios , siempre en su envase original, en lugar cerrado bajo llave.
*Realice el triple lavado.
*Inutilice los envases vacíos perforando el fondo.

RIESGO PARA EL AMBIENTE:
Moderadamente tóxico para abejas, aves y peces. No contaminar arroyos y otras fuentes de agua.

INTOXICACIONES: El producto es venenoso si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel.

PRIMEROS AUXILIOS: En casos de: Contacto con la piel, lávese las partes afectadas con abundante agua y jabón. Ingestión, no provoque vómito, tome abundante agua. Inhalación: colocar al afectado en lugar aireado. En todos los casos busque inmediatamente atención médica.

INFORMACIONES PARA EL MEDICO:
Clase toxicológica IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro.
Grupo Químico: BENZOILUREAS.
ANTIDOTO: Ninguno específico - Tratamiento sintomático.

TRATAMIENTO EN CASO DE INTOXICACIONES:
Realizar lavado gástrico, tomando cuidado porque existe peligro de inducir a neumonía química por aspirado del producto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - Hospital de Emergencias Médicas. Gral. Santos y T. S. Mongelós. Tel: 204800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

BAYER

Insecticida

Alsystin® 480SC

De contacto e ingestión especialmente para insectos masticadores.
Suspensión Concentrada
Grupo químico: Benzoilureas

Composición:

Triflumuron: 1-(2-clorobenzoil)-3-(4-trifluorometoxifenil) urea	48 % (480 g/l)
Inertes:	52 % (520 g/l)

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registro SENAVE: 2.360 Cert. de Libre Venta : 2.051

CONTENIDO: 1 Litro

Lote Nº y Vencimiento: Ver en el envase.

Fabricado en Brasil
por: Bayer S.A.
Estrada da Boa Esperanza 650
CEP 26 110-100
Belford Roxo/RJ-Brasil

Fabricado en Argentina
por: Bayer S.A.
Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD) - Munro, Bs.As.
Leverkusen (Alemania) Tel. 4762 7000
www.bayercropscience.com

Registrado en Paraguay
por: Bayer S.A.
Avda. Sta. Teresa 2.245 c/ Av. del Chaco Tel: (021) 617 3000
Fax: 617 3501
Asunción- Paraguay
Reg. SENAVE Nº: 31

CARACTERISTICAS:
Alsystin ®: es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la síntesis de quitina (Afecta el proceso de muda), especialmente en insectos masticadores. Por eso mata las larvas, pero no los adultos (No afecta a adultos de insectos benéficos). Debido a su forma de acción, es de baja toxicidad para los vertebrados.

Forma de aplicación:
Alsystin® debe ser aplicado con equipos terrestres (Mochila o pulverizador de barra), utilizando picos cónicos, presión de 80 a 100 lib/pulg2, 200 a 300 litros del caldo por hectárea.
En aplicaciones aéreas, utilizar caudal de de 20 a 40 lts/ha,
En tomate aplicar 1000 lts/ha. En cítricos 2000 lts/ha.

Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	
		ml/ha	ml/100 lts. agua
Algodón	Ysó Carú *Alabama argillacea*	30-80	
Arroz	Oruga de gramineas *Mocis latipes* Oruga militar *Spodóptera sp.*	30-80	
Citricos	Minador de hojas *Phyllocnistis citrella*		30
Girasol	Oruga peluda *Spilosoma virginica*	30	
Tomate	Broca *Heliothis zea* Palomilla *Scrobipalpula absoluta*		30
Maíz y Sorgo	Gusano Cogollero *Spodóptera sp.*	50-80	
Soja	Oruga de la soja *Anticarsia gemmatalis*	30	
Trigo	Oruga de gramineas *Mocis latipes* Oruga de espiga *Spodóptera sp.* Oruga del trigo *Pseudaletia sequax*	30-80	

Número, época e intervalo de aplicación:
en todos los cultivos se inician las aplicaciones con Alsystin ® cuando comienza la oviposición (máximo vuelo de mariposas), cuando eclosionan las larvas, ó como máximo en los estadios iniciales de desarrollo de las orugas. Normalmente es hecha una aplicación en Soja y Maíz y seis en Tomate.

Compatibilidad y fitotoxicidad:
puede mezclarse con Fungicidas como: FOLICUR y SPHERE, y con insecticida como: BULLDOCK. A las dosis recomendadas no se ha detectado fitotoxicidad.

PY 84475807a 01/2015

CUIDADO