

GENERALIDADES:

Cropstar® es un insecticida compuesto; mezcla de dos grupos químicos diferentes: Neonicotinoides (Imidacloprid 15 %), que actúa en forma sistémica; y Carbamatos (Thiodicarb 45 %), que actúa por contacto e ingestión; formulado como Suspensión Concentrada para Tratamiento de Semillas. Usado en la manera recomendada, protege a las semillas y a las plántulas emergidas del ataque de insectos del suelo, insectos chupadores y orugas de lepidópteros que atacan a la parte aérea, proporcionando al cultivo una excelente protección inicial para el apropiado establecimiento del stand ideal de plantas, gracias a su prolongado efecto residual. Tiene un efecto adicional de repelencia de hormigas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos	Plaga / Objetivo	Dosis ml/Ha mi/100kg de semillas	Época de Aplicación	L.M.R. (mg/kg p.c.)
Maíz Soja	Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda) Gusano Elasmom- (Elasmopalpus ignosellus) Chinche Barriga Verde (Dichelops melacanthus) Vaquita, (Diabrotica speciosa) Oruga rosca (Agrotis sp)	300ml	Tratamiento de semillas: directamente sobre las semillas, utilizando equipos apropiados para esta finalidad.	0,1-0,5

INDICACIONES DE USO:

Forma de aplicación: Aplicar el producto directamente sobre las semillas, tratando de que tenga una distribución uniforme. Usar tambor rotativo de eje excéntrico u otra máquina para el efecto.

Tambor rotativo: colocar las semillas y aplicar la mitad de la dosis recomendada del producto; girar el tambor varias veces y aplicar el producto hasta completar la dosis recomendada. Dejar secar las semillas a la sombra y proceder a la siembra.

Máquinas tratadoras: Verificar el rendimiento de las máquinas según las semillas a ser tratadas. Colocar el producto en el reservorio y calibrar la máquina antes de iniciar el tratamiento. Dejar secar las semillas a la sombra y proceder al tratamiento

COMPATIBILIDAD:

Cropstar® es compatible con fungicidas, insecticidas y fertilizantes para tratamiento de semillas. Agite bien el producto antes de su aplicación. No consumir las semillas tratadas. Destinarlas exclusivamente para la siembra.

Tiempo de reingreso al área tratada.

Como el producto se aplica en tratamiento de semilla, se puede ingresar al campo inmediatamente después de la siembra. El producto quedará enterrado junto con la semilla.

Períodos de carencia

No determinada por tratarse de tratamiento de semillas antes de la siembra.

Fitotoxicidad: No fitotóxico en las condiciones recomendadas.

PV 844613556 01/2018



Insecticida
Para tratamiento
de semillas.

Cropstar®

Suspensión Concentrada
para tratamiento de semillas (FS)
Grupo químico: Neonicotinoides + Carbamato

Composición:

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N- nitroimidazolidin-2-ylideneamine	15 % (150 g/l)
Thiodicarb: 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxo-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazpentadeca-3,12-diene-6,10-dione	45 % (450 g/l)
Inertes	62 % (620 g/l)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Reg. SENAVE N°: 3.503 Cert. de Libre Venta N°: 3.058

Lote N°:
Elab.
Vto.

ZONA LIBRE DE IMPRESIÓN 20mm x 70mm

No inflamable. No corrosivo. No explosivo
CONTENIDO NETO: 5 litros

Fabricado en Brasil por: Bayer S.A.
Estrada da Boa Esperanza 650, CEP 26 110-100.
Belford Roxo/RJ-Brasil

Fabricado en Argentina por: Bayer S.A.
Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD) - Munro, .
Bs.As, Argentina, Tel. 4762 7000.
www.bayercropsience.com

Registrado en Paraguay por: Bayer S.A.
Avda. Santa Teresa 2245, Tel: (021) 617 3500
Fax: 617 3501
Asunción- Paraguay, Reg. SENAVE N°: 31



NOCIVO



ABRIR
AQUI

Contiene Folleto

PRECAUCIONES GENERALES:
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.

INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Durante la manipulación y aplicación, use ropa protectora adecuada: con mangas largas, delantal, botas y guantes impermeables, antiparras y mascarar con filtro adecuado. Evite comer, beber o fumar durante el manejo y la aplicación del producto.

Evite el contacto del producto con la piel, boca, nariz y ojos. Mantenga este y otros productos fitosanitarios siempre en su envase original, en lugar fresco, seco y cerrado bajo llave.

Después de la aplicación, bañese, cambie y lave las ropas de trabajo.

No reutilice este envase. Inutilícelo perforando el fondo.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto es muy poco tóxico para peces y microorganismos acuáticos. No contamine cursos y otras fuentes de agua.

Levemente tóxico para abejas y aves, pero por su

forma de aplicación no reviste peligro.

CLASE TOXICOLÓGICA II: MODERADAMENTE PELIGROSO

Instrucciones en caso de accidentes

Contacte a las autoridades locales competentes y a la empresa (Bayer S.A. Tel: 021- 617 3000 Fax: 617 3501).

- Aisle y señalice el área contaminada.

- En caso de derrame, detener el escurrimiento, no permitiendo que el producto entre en alcantarillados, drenajes o cursos de aguas.

-Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases durante 30 segundos. El agua del enjuague puede volcarse en un pozo conteniendo cal en su interior o puede ser asperjada en banquetas o caminos de tierra. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser recogidos por CAMPOLIMPIO - Programa de manejo de envases vacíos-CAFYF-CropLife.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión, no provoque vómito, beba abundante agua y busque inmediata atención médica. En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua. Si se presentan señales de irritación, busque atención médica.

Contacto con los ojos: lávelos con agua corriente durante 15 minutos. Si se presenta irritación, busque inmediatamente atención médica.

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO:

Riesgos para la salud humana. Según la OMS: Clase Toxicológica II (Moderadamente peligroso)

Imidacloprid : No posee Antídoto específico. Realizar Tratamiento sintomático.

Thiodicarb: Administrar Atropina IV hasta que se presenten síntomas de atropinización.

Nunca administre Atropina antes de la aparición de los síntomas de intoxicación.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Mareos, apatía, falta de tonicidad muscular, calambres. En casos severos, trastornos respiratorios, temblores, estremecimientos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - Hospital de Emergencias Médicas. Gral. Santos y T. S. Mongelós. Tel: 204800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en esta etiqueta o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

PY 84461385e 01/2018



Insecticida
Para tratamiento
de semillas.

Cropstar®

Suspensión Concentrada
para tratamiento de semillas (FS)
Grupo químico: Neonicotinoides + Carbamato

Composición:

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N- nitroimidazolidin-2-ylideneamine	15 % (150 g/l)
Thiodicarb: 3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazpentadeca=3,12-diene-6,10-dione.....	45 % (450 g/l)
Inertes.....	62 % (620 g/l)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Reg. SENAVE N°: 3.503 Cert. de Libre Venta N°: 3.058

Lote N°: ver envase
Elab. ver envase
Vto.: ver envase

No inflamable. No corrosivo. No explosivo
CONTENIDO NETO: 5 litros

Fabricado en Brasil por: Bayer S.A.

Estrada da Boa Esperanza 650, CEP 26 110-100,
Belford Roxo/RJ-Brasil

Fabricado en Argentina por: Bayer S.A.

Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD) - Munro,
Bs.As, Argentina, Tel. 4762 7000,
www.bayercropsience.com

Registrado en Paraguay por: Bayer S.A.

Avda. Santa Teresa 2245, Tel: (021) 617 3500

Fax: 617 3501

Asunción- Paraguay, Reg. SENAVE N°: 31



NOCIVO

